

大腸内視鏡検査を受けられる方へ


— マグコロール散を服用される前に、このパンフレットをよくお読みください。 —

年 月 日 時 分にお越しください。

- ★ 受付にこの用紙と保険証をお出してください。
 - ★ 当日の便の状態により順番が前後する場合があります。ご了承ください。
- 午前の診療終了時間や、内視鏡手術の件数などにより、長くお待たせしてしまうことがあります。お時間に余裕をもってお越し頂くようお願い致します。


◎ 検査について

この検査は、肛門から内視鏡を挿入して大腸の内腔を直接観察し、大腸の炎症性の病気（腸のただれ・きず）、大腸のポリープ、その他を診断する検査です。
検査は 15～30 分位で終わります。



◎ 検査前の準備について

大腸内をからっぽにして、検査を行います。
図のように、大腸の中に食物の残渣（便）が残っていると、検査のさまたげになり、検査が受けられなかったり、正確な診断が得られないことがあります。
そのようなことがないように、このパンフレットの指示を守り、検査にご協力ください。



- できるだけご家族の方などがおられるところでマグコロール散を服用してください。
- 検査 1 週間前からの排便状況をチェックし、マグコロール散の服用前日または当日に排便のない方はあらかじめ医師または看護師に連絡してください。



まべ五稜郭消化器・内視鏡クリニック
院長 間部 克裕

〒040-0001 函館市五稜郭町 34-12 サンセイメディカルプラザ2階

TEL : 0138-86-7633 / FAX : 0138-86-7635

〔 予約変更・中止はホームページで行うか、
TEL : 0138-86-7633 まで電話をお願いします。 〕

※ご都合により、検査が受けられない場合は早めに電話でご連絡ください。

《食事について》

【検査3日前～2日前】

〈避けてほしいもの〉タネや消化されず残るもの

きのこ類、海藻類 （ひじき、わかめ、昆布、のり巻き）

繊維の多い野菜類 （ほうれん草、白菜、レタス、キャベツ、ごぼう、サツマイモ、トマト、トウモロコシ、ネギ類）

タネのある果物や野菜

（イチゴ、キウイ、メロン、スイカ、ブドウ、トマト など）

玄米、ごま、しらたき、こんにゃく

*** 上記以外のご飯、肉、魚などは制限なく通常に食べられます。**


【検査前日】

大腸検査食のみを召し上がりください。


【検査当日】

検査当日は絶食です。水分は脱水を防ぐためにしっかりお飲みください。

【飲んでいいもの】




【飲んではいけないもの】



マグコロール散の溶かし方・飲み方

水を入れるときは容器の底を十分に広げてください。



①キャップを開け、約 500mL
(500 の目盛) の水を入れて
ください。


②キャップ閉め、左右に
よく振って粉末を十分に
溶かしてください。

③全量が1800mL (1800 の目盛)
になるまで水を追加してくだ
さい。
平らなところに置いて1800 の
目盛まで水が入っていることを
確認してください。

大腸内視鏡検査の準備表

正確な良い診断が受けられるように、準備を確実にを行い検査にご協力ください。

指示どおり準備を行い、チェック欄に✓印をつけてください。

時 間		ご 準 備		チェック
検査前日 (/)	食 事		検査食（エニマクリンPO）を召し上がりください。 足りない場合や食べられないものがある場合、プリン、豆腐、プレーンヨーグルト、ごはんは食べても構いません	
	○ 夕食以降、検査まで絶食になります。 ○ 水分は十分に摂ってください。			
	午後6 時 ～6 時半		① 水薬(ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%) 1 本をコップ 1 杯 (200mL) 程度の水に入れて飲んでください。 ② マグコロール散に水を入れて溶かし、約半分 (900mL)を 30 分位で飲んでください。 ※特にご高齢の方は、時間をかけてゆっくり飲んでください。	
検査当日 (/)	朝食・昼食は食べないでください。			
	午前6 時 服用開始		残りのマグコロール散（900mL）を 30 分位で飲んでください。 ※特にご高齢の方は、時間をかけてゆっくり飲んでください。	

◎ マグコロール散の服用時間に関係なく、排便をうながす為に水分をできるだけたくさん飲んでください。

◎ 果実のついていない“あめ”をなめたり、ガムを噛むのは可能です。

メモ